

Nyhetsbrev Villsvinprosjektet

Feller ledige for testing

Siden august 2020 har vi testet 5 feller, 2 multifeller og 3 enkeltfeller, i en spredt geografi. Vi tester fellene i hele prosjektområdet mellom Halden og Elverum og i ulike biotoper (nært jordbruksareal, i skog osv.). Så langt har vi ikke fanget villsvin, men det har vært villsvin like ved eller i fella når denne har stått åpen i en tilvenningsfase (Se bilder). Erfaringene fra fellerøkterne viser at det er nokså arbeids- og tidskrevende, da fella skal ha daglig tilsyn og må åtes med jevne mellomrom.

Vi har nå ledig to feller, en multifelle og en enkeltfelle. Dersom du ønsker å teste en av fellene vennligst ta kontakt med: Maximilian Zimmermann, max.zimm@norskog.no eller tlf: 41468098




Figur 1: Fellene har hatt besøk av villsvin flere ganger, men så langt har ingen blitt fanget

Spor og sportegn

I den siste tiden har det kommet sporsnø mange plasser. Dette gir gode muligheter for å kunne se om det er villsvintrafikk i terrenget. Spor og avtrykk er ofte det første man ser. Det som kjennetegner villsvinspor, er at de har lange og sprikende biklauver som syns tydelige for hvert avtrykk (også på barmark). Biklauvene er dessuten bredere enn framklauvene noe som ikke er vanlig hos f.eks. elg eller hjort.

Andre sportegn som roting i jorda eller gjørmegroper gjerne med «skrubbetrær» i umiddelbar nærhet er sikre kjennetegn på at det er villsvin i området.



Figur 2: Spora til villsvinetkjennetegnes ved lange og sprikende biklauver.



Figur 3: "Skrubbetrær" med gjørme oppover stammen er et sikkert kjennetegn på villsvin, ut fra høyden på gjørma kan man også dra sluttninger på størrelsen på villsvina som har vært der.